

Familia terapeutica	Fármaco	Indicación terapeutica	Dosis	Via de administración	Frecuencia	Síntomas	Reversible	Precauciones
<b>Inhibidores de la bomba de protones</b>	Omeprazol	Úlceras gástricas	20 mg	Oral y parenteral	Rara	Vértigo	No determinada	
	Esomeprazol		30 mg	Oral y parenteral	Rara	Vértigo	No determinada	
	Pantoprazol		40 mg	Oral y parenteral	Poco común	Vértigo	No determinada	
	Rabeprazol		20 mg	Oral	Común	Vértigo	No determinada	
<b>Diuréticos</b>	Ac. etacrínico		50 mg	Oral y parenteral	Común	Hipoacusia y acúfenos	Sí	Dosis altas, vía intravenosa, insuficiencia renal, asociación con otros ototoxicos
	Furosemida		40 mg	Oral y parenteral	Rara	Hipoacusia y vértigo	Solo por vía oral	
	Torsemida		15 mg	Oral y parenteral	Rara	Hipoacusia y acúfenos	Sí	Dosis altas, vía intravenosa y asociación con otros ototoxicos
<b>Beta-bloqueantes</b>	Carvedilol	Hipertensión arterial	37,5 mg	Oral	Común	Vértigo	Sí	
	Metoprolol		150 mg	Oral y parenteral	Común	Vértigo	Sí	
	Nadolol		160 mg	Oral y parenteral	Rara	Vértigo	Sí	
	Nebivolol		5 mg	Oral y parenteral	Común	Vértigo	Sí	
	Pindolol		15 mg	Oral y parenteral	Común	Vértigo	Sí	
	Propranolol		160 mg	Oral y parenteral	Rara	Vértigo	Sí	
<b>Antibióticos</b>	Cloranfenicol	Infecciones bacterianas	3 g	Oral y parenteral	Rara	Hipoacusia	No	Administración tópica
	Amikacina		1 g	Parenteral	Vértigos rara; acúfenos e hipoacusia poco común.	No	Dosis altas, uso crónico, ancianos, insuficiencia renal, asociación con otros ototoxicos	
	Estreptomina		1 g	Parenteral	Vértigos rara; acúfenos e hipoacusia poco común.	No		
	Gentamicina		240 mg	Parenteral	Acúfenos rara, Vértigos poco común	No	Dosis altas, uso crónico, ancianos, insuficiencia renal, asociación con otros ototoxicos, predisposición genética y no usar en perforaciones timpánicas	
	Kanamicina		1 g	Parenteral	Vértigos rara; acúfenos e hipoacusia poco común.	No	Dosis altas, uso crónico, ancianos, insuficiencia renal, asociación con otros ototoxicos	
	Neomicina			Ótica, oftálmica	Común	Hipoacusia, vértigos, acúfenos	Sí	Dosis altas, uso crónico, ancianos, niños, antecedentes de hipoacusia, no usar en perforaciones timpánicas asociación con otros ototoxicos
	Tobramicina		240 mg	Parenteral	Vértigo> hipoacusia> acúfenos	No	Dosis altas, uso crónico, ancianos, insuficiencia renal, predisposición genética y asociación con otros ototoxicos	
	Eritromicina		1 g	Oral y parenteral	Poco común	Hipoacusia	Sí	Dosis altas, insuficiencia renal o hepática, ancianos y mujeres.
	Lincomicina		1,8 g	Oral y parenteral	Rara	Acúfenos, Vértigos	Sí	
	Doxiciclina		100 mg	Oral y parenteral	Rara	Acúfenos, Vértigos	Sí	
	Tetraciclina		1 g	Oral y parenteral	Rara	Acúfenos, Vértigos	Sí	
	Minociclina		200 mg	Oral y parenteral	Rara	Acúfenos, Vértigos	Sí	Vía intravenosa y mujeres
	Vancomicina		2 g	Parenteral	Común	Hipoacusia, vértigos, acúfenos	Ocasionalmente	Dosis altas, ancianos, antecedentes de hipoacusia y asociación con otros ototoxicos.
	Capreomicina		1 g	Parenteral	Común	Hipoacusia, vértigos, acúfenos	No determinada	Adultos, insuficiencia renal y en asociación con otros ototoxicos
<b>Antifúngicos</b>	Antofotricina B	Infecciones por hongos	350 mg	Parenteral	Rara	Acúfenos, Vértigos	Solo los acúfenos	Adultos, insuficiencia renal, asociación con otros ototoxicos y no usar en perforaciones timpánicas
	Fluconazol		200 mg	Oral y parenteral	Común	Vértigos	No determinada	
	Itraconazol		200 mg	Oral y parenteral	Poco común	Vértigos	Sí por vía oral	asociación con otros ototoxicos.
	Posaconazol		800 mg	Oral	Poco común	Vértigos e hipoacusia	No determinada	
	Voriconazol		400 mg	Oral y parenteral	Poco común	Acúfenos, Vértigos	No determinada	
<b>Antiviricos</b>	Abacavir	Infecciones virales	600 mg	Oral	No determinada	Vértigo	No determinada	
	Aciclovir		4 g	Oral y parenteral	No determinada	Vértigo	No determinada	
	Didanosina		400 mg	Oral	Rara	Vértigo e hipoacusia	No determinada	
	Efavirenz		600 mg	Oral	Poco común	Vértigo	No determinada	
	Foscarnet		6.5 g	Parenteral	No determinada	Vértigo	No determinada	
	Indinavir		2.4 g	Oral	Común	Vértigo	No determinada	
	Oseltamivir		150 mg	Oral	Poco común	Vértigo e hipoacusia	No determinada	Niños
	Ribavirina		6g / 1 g	Inhalada / oral	Común	Acúfenos, vértigos e hipoacusia	No determinada	
	Ritonavir		1.2 g	Oral	Común	Acúfenos, vértigos e hipoacusia	No determinada	
	Saquinavir		1.8 g	Oral	No determinada	Acúfenos e hipoacusia	No determinada	
	Zanamivir		20 mg	Inhalada	Rara	Hipoacusia	No determinada	
Zidovudina	600 mg	Oral y parenteral	Poco común	Vértigo e hipoacusia	No determinada			
<b>Antineoplásicos</b>	Carboplatino	Procesos neoplásicos	400 mg/m <sup>2</sup>	Parenteral	Acúfenos comunes; vértigos raros	No determinada		Dosis altas, niños y utilizado en asociación con cisplatino
	Cisplatino		50-120 mg/m <sup>2</sup>	Parenteral	Común	Acúfenos, vértigos e hipoacusia	No	Dosis altas, niños y utilizado en asociación con gentamicina y otros antineoplásicos.
	Dasatinib		100 mg	Oral	Común	Acúfenos, Vértigos	Sí	
	Daunorubicina		0.5-3 mg/kg	Parenteral	Poco común	Hipoacusia	No determinada	Cuando se asocia con ciclosporina
	Deferoxamina		20-40 mg/kg	Parenteral y subcutánea	Poco común	Acúfenos e hipoacusia	No determinada	
	Fludarabina		40 mg/m <sup>2</sup> 25 mg/m <sup>2</sup>	Oral y parenteral	Rara	Acúfenos, Vértigos	No determinada	Cuando se asocia con gentamicina
	Imatinib		600 mg	Oral	Rara	Acúfenos, Vértigos	No determinada	
	Oxaliplatino		85 mg/m <sup>2</sup>	Parenteral	Poco común	Acúfenos, vértigos e hipoacusia	No determinada	
	Paclitaxel		260 mg/m <sup>2</sup>	Parenteral	Poco común	Acúfenos e hipoacusia	No	Cuando se asocia con cisplatino
	Sorafenib		800 mg	Oral	Común	Acúfenos	Sí	
	Vinblastina		3.7-11.1 mg/m <sup>2</sup>	Parenteral	Rara	Acúfenos e hipoacusia	Sí	Dosis altas y cuando se usa en asociación con otros antineoplásicos
Vincristina	1.4 mg/m <sup>2</sup>	Parenteral	Rara	Acúfenos e hipoacusia	Sí	Dosis altas y cuando se usa en asociación con otros fármacos ototoxicos		
<b>Inmunosupresores</b>	Natalizumab	Esclerosis múltiple	300 mg/4 semanas	Parenteral	Común	Vértigo	Sí	
	Tacrolimus	Rechazo trasplantes	10 mg	Oral y parenteral	Común	Acúfenos e hipoacusia	Sí	Dosis altas y administración intravenosa
<b>Antiinflamatorios no esteroideos</b>	Acido acetil salicílico	Inflamaciones	3 g	Oral	Común	Acúfenos, vértigos e hipoacusia	Sí	Dosis altas, uso crónico.
	Ac. mefenámico		1 g	Oral	No determinada	Vértigos	No determinada	
	Celecoxib		200 mg	Oral	Poco común	Acúfenos y vértigos	No determinada	
	Diclofenaco		1 g	Oral, parenteral y rectal	Rara	Acúfenos, vértigos e hipoacusia	Sí	Dosis altas
	Ibuprofeno		1.2 g	Oral, rectal	Rara	Acúfenos, vértigos e hipoacusia	Sí	Dosis altas
	Indometacina		1 g	Oral, parenteral y rectal	No determinada	Acúfenos, vértigos e hipoacusia	Sí	Dosis altas
	Naproxeno		500 mg	Oral, rectal	Poco común	Acúfenos, vértigos e hipoacusia	Sí	Dosis altas, uso crónico y en la insuficiencia renal
	Piroxicam		20 mg	Oral, parenteral y rectal	Rara	Acúfenos y vértigos	No determinada	
<b>Antiepilépticos</b>	Acido Valproico	Epilepsia	1.5 g	Oral, parenteral y rectal	Común	Vértigos e hipoacusia	Sí	Antecedentes de hipoacusia y efectos teratogénicos en el oído
	Carbamacepina		1 g	Oral, rectal	Poco común	Acúfenos	Sí	Uso crónico
	Fenitoína		300 mg	Oral	Poco común	Acúfenos	Sí	
	Levetiracetam		1.5 g	Oral y parenteral	Común	Vértigos	Sí	
	Gabapentina		1.8 g	Oral	Rara	Acúfenos, vértigos e hipoacusia	Sí	Dosis altas
	Pregabalina		300 mg	Oral	Común	Acúfenos y vértigos	Sí	
	Topiramato		300 mg	Oral	Común	Acúfenos, vértigos e hipoacusia	Sí	Niños
<b>Antipsicóticos</b>	Aripiprazol	Psicosis y esquizofrenia	15 mg	Oral y parenteral	Poco común	Acúfenos y vértigos	Sí	
	Olanzapina		10 mg	Oral, parenteral y parenteral depot	Poco común	Acúfenos y vértigos	Sí	
	Paliperidona		6 mg / 2.5 mg	Oral y parenteral depot	Rara	Acúfenos y vértigos	Sí	
	Quetiapina		400 mg	Oral	Poco común	Acúfenos y vértigos	Sí	
	Risperidona		5 mg / 2.7 mg	Oral y parenteral depot	Poco común	Acúfenos, vértigos e hipoacusia	Sí	
<b>Antidepresivos</b>	Amitriptilina	Depresión	75 mg	Oral y parenteral	Rara	Acúfenos, vértigos e hipoacusia	No determinada	
	Imipramina		100 mg	Oral	Rara	Acúfenos, vértigos e hipoacusia	No determinada	
	Nortriptilina		75 mg /30 mg	Oral y parenteral	Rara	Acúfenos, vértigos e hipoacusia	No determinada	
	Fluoxetina		20 mg	Oral	Rara	Acúfenos	No determinada	Los acúfenos pueden ocurrir durante el tratamiento y como síndrome de retirada
	Fluoxamina		100 mg	Oral	Poco común	Vértigo	Sí	
	Paroxetina		20 mg	Oral	Poco común	Acúfenos y vértigos	No determinada	Los acúfenos pueden ocurrir durante el tratamiento y como síndrome de retirada
	Sertralina		50 mg	Oral	Común	Acúfenos	No determinada	Los acúfenos pueden ocurrir durante el tratamiento y como síndrome de retirada
Venlafaxina	100 mg	Oral	Común	Acúfenos y vértigos	No determinada	Los acúfenos pueden ocurrir durante el tratamiento y como síndrome de retirada		